

چگونه با بیماری خطرناک جاروک لیموترش مبارزه کنیم



بیماری خطرناک جاروک لیمو ترش یا جاروی جادوگر
مرکبات بوسیله نوعی موجود ذره بینی بسیار ریز تنک سلولی به نام فایتوفلا سما بو جود می آید. این بیماری فرظئینه ای موجب کاهش کمیت و کیفیت میوه و در نهایت باعث مرگ تدریجی درختان آلوده لیموترش می گردد. میکروبی که عامل بیماری است دارای خصوصیات زیر می باشد:

۱) اندازه آن بسیار ریز است و فقط پس از رنگ آمیزی بوسیله میکروسکوپ دیده می شود.

۲) نوعی انگل اجباری است که فقط درون نسج زنده گیاه رشد می کند و تغذیه آن از شیره گیاهی و جذب مواد غذایی مورد نیاز گیاه باعث گرسنگی، ضعف و مرگ تدریجی گیاه می شود.

توسعه پایدار در کشاورزی

هم اکنون سه دهه از توجه جهانی به موضوع حفاظت محیط زیست و حدود نو دهه از مباحث پیرامون تو سعه پایدار می گذرد. یکی از نتایج اجلاس جهانی توسعه پایدار (ژوهانسبورگ ۲۰۰۲ میلادی) الزام جامعه جهانی بر رویکرد توسعه پایدار است . علاوه بر آن و با توجه به اهداف کشاورزی ملل متحد که همانا رفع فقر و محرومیت جوامع روستایی، اشتغال پایدار در بخش کشاورزی ، تولید پایدار محصولات کشاورزی و حفاظت از منابع پایه تولید و منابع طبیعی می باشد و بر اساس کنوانسیونهای بین المللی و تعهدات جامعه جهانی در این ارتباط، حرکت در مسیر توسعه پایدار کشاورزی یک ضرورت به شمار می رود.

به عبارتی توسعه پایدار آن توسعه ای است که از نظر اقتصادی پربازده و مستمر ، از نظر اجتماعی عادلانه، از نظر زیست محیطی و اکولوژیکی غیرمخرب و از نظر فن اوری و

کشاورزی و حفاظت از منابع طبیعی می باشد.

علاوه بر موارد فوق ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستائیان و کشاورزان از دیدنگ تعهدات بخش کشاورزی و حفاظت از منابع طبیعی می باشد.

دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی از طریق:

۱- صیانت و توانمندسازی منابع انسانی
۲- تأمین امنیت غذایی
۳- حفاظت ازمنابع پایه تولید
۴- ارتقاء سطح زندگی و درآمد روستائیان و کشاورزان
۵- تلاش جهت نیل به خودکفایی در محصولات اساسی

۶- ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی
۷- اصلاح و بهینه سازی الگوی مصرف و هدفمندسازی بارانه ها
۸- توسعه پایدار روستاها و رفع فقر و محرومیت همراه با تقویت زیرساخت های تولید به ویژه در صنایع تبدیلی



۹- اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی
۱۰- ارتقاء ضربه بهره وری از منابع آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده علمی و بهره برداری از سایر نهادهای تولید
۱۱- نوین سازی نظام تولید کشاورزی از طریق تقویت و توسعه تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزی و بومی سازی فناوری های جدید

◀ **بیماری جاروک لیموترش ویروسی تبست اما عامل آن خیلی ریز ودر مقابل سموم شیمیایی مقاوم است**

◀ **مراقبت، سرکشی و بازیبنی مداوم و منظم درختان بصورت هفتگی و یا ماهانه بسیار ضروری است**

♦

این نظر به بیماری ویروسی بسیار شبیه است. ضمناً این بیماری از طریق خاک و ریشه و یا بوسیله بذر و دانه لیموترش منتقل نمی شود.

این بیماری در طبیعت علاوه بر انواع لیموترش ، در گریپ فروت ، بکرای (تلخو) و بالنگا(ترنج) بعضی از پایه های مرکبات و تعدادی از علفهای هرز در باغ مرکبات هم آلودگی ایجاد می کند اما خوشبختانه درختان پرتقال، نارنگی به این بیماری دچار نمی شوند. گیاه انگل سس (با نام محلی آسمون کته)، پیوندک و نهال های پیوندی از مهمترین راه های انتقال بیماری جاروک به درختان حساس می باشند. نوعی حشره مکنده به نام زنجرک احتمالاً مهم ترین ناقل این بیماری محسوب می شود که در باغات مرکبات هرمزگان به فراوانی وجود دارند.

بر اساس خصوصیات عامل بیماری، محل زندگی میکروب مذکور در گیاه، مقاومت آن در برابر سموم و روشهای انتقال بیماری، مبارزه با بیماری جاروک لیموترش متکی به روش های پیشگیری و از بین بردن گیاهان آلوده می باشد که در چند گام بسیار مهم بصورت زیر بایستی اجرا شود. به هر حال علمی ترین و اقتصادی ترین روش ها برای کم کردن منابع آلودگی

و کاستن از خسارت بیماری شامل ارقام و تیپ های محلی مقاوم و همچنین ریشه کنی و از بین بردن درختان آلوده، بلافاصله پس از مشاهده علائم نشانه های بیماری ، حتی فقط در یک شاخه آنها

درختان کاملاً ضروری است. در این زمینه همباری دوجانبه باغداران گرامی و مروجان و کارشناسان، شانس موفقیت را چند برابر می کند.
گام پنجم: حتماً محلول پاشی سریع روی سرتاسر تاج درخت های آلوده و چند درخت اطراف آن با استفاده از سموم حشره کش نفوذی و یا سیستمیک قوی با نظارت مروجین و کارشناسان برای کشتن حشرات مکنده (بخصوص حشرات ریزی به نام زنجرک) انجام گیرد. این کار حتماً و اکیداً بایستی پیش از ریشه کنی درختان آلوده انجام شود. به این ترتیب حشراتی که میکروب را در بدن خود پرورش می دهند می میرند و پخش برای انتقال و پخش کردن آن در باغ ها و مناطق اطراف نخواهند داشت. اصولاً محلول پاشی با حشره کش های نفوذی در صورت منظم و دوره ای (۲ تا ۴ بار در سال) در باغات مرکبات توصیه می شود.

گام ششم: بدون شک و قبل از اینکه فرصت از دست برود بایستی با نظرات دقیق باغداران و کارشناسان منطقه آلوده را ریشه کن کرد و در صورت امکان سوزاند. هرگز نباید به قطع کردن یک شاخه آلوده قانع شد زیرا بیماری در چنین درختی تمام قسمت های زیرزمینی و هوایی درخت را کاملاً آلوده کرده و آن

درخت به منبعی از میلیون ها میکروب بیماری را تبدیل شده است. ضمناً با قطع کردن یک شاخه ، حشره های ناقل تحریک می شوند و از شیره آلوده آن بیشتر تغذیه می کنند. ریشه کنی در کوتاه ترین زمان ممکن و تا آخرین درخت آلوده باید ادامه یابد.

گام هفتم: بازیبنی ای مجدد و مکرر جای درختان ریشه کن شده و حذف و از بین بردن ریشه ها و تنه های آلوده ای که احتمالاً دوباره رشد می کنند بسیار مهم است و بسیار اتفاق افتاده است که پس از

۱۲- توسعه و تقویت تشکلهای

اقتصادی، اجتماعی و تخصصی در

بخش کشاورزی

۱۳- مکانیزاسیون و تکنولوژی پاک در تمامی زیربخش ها در راستای تولید محصولات پاک کشاورزی تأمین می گردد.کشاورزی پایدار یک نظام تولید و توزیع محصولات کشاورزی است که به یکپارچگی چرخه ها و کنترل های بیولوژیکی طبیعی نیل پیدا می کند، از حاصلخیزی خاک و منشاء طبیعی حفاظت کرده، همچنین آنها را تجدید می نماید.

مدیریت و بهره برداری از منابع غیرقابل تجدید شونده و نهادهای خریداری شده تولید را کاهش می دهد، درآمد زراعی متناسب و قابل اطمینان را تأمین می کند، فرصت ها در کشاورزی خانوار و جوامع کشاورز را ارتقاء می بخشد، اثرات نامازگار را به دهاشت، ایمنی، حیات وحش، کیفیت آب و محیط زیست را تقلیل می دهد.

مشخصات بارز توسعه پایدار کشاورزی

عبارتند از:


۱- هماهنگی اکولوژیکی (سلامتی محیط زیست)

به معنای حفظ کیفیت منابع طبیعی و نیروهای حیاتی در تمامی اجزا اکوسیستم، از انسان گرفته تا دام، موجودات زنده خاک، کشت و زرع و ... یعنی ضایعات حداقل بوده، انرژی به صورت بهینه و سالم به کار گرفته شده و آلودگی ها به صفر برسد.

۲- پویایی و پایدایی اقتصادی (دوام اقتصادی)

یعنی دست اندرکاران تولید در بخش کشاورزی (تمامی زیربخش ها) از امکانات لازم برای تولید، درآمد کافی، راندمان مناسب در تولید، هزینه بکارگیری نیروی کار مناسب و نهاده های مورد نیاز برخوردار باشند، بازار مناسب هم برای تولید وجود داشته باشد.

۳- عدالت اجتماعی (پدیرش و تطایق اجتماعی)
بدین مفهوم که منابع و قدرت کار و تولید و فعالیت و به طور کلی نیازهای اساسی برای همه افراد دست اندرکار تولید در جامعه کشاورزی تأمین شده و حقوق لازم در استفاده از اراضی ، سرمایه کافی برای سرمایه گذاری،



اطراف رود نیل ، گزارش داده اند و سپس در سال ۱۶۶۸ از آنجا به وسیله برده های سیاهپوست مهاجر، به آمریکا برده شده است، امروزه سطح وسیعی از زمین های زراعی این سرزمین، زیرکشت بامیه قرار دارد.

خواص بامیه

میوه بامیه دارای ویتامین های آ، ب و ث است. مواد کمیابی مانند منگنز و کبالت که بدن انسان به آنها نیاز دارد و به مقدار کافی در این گیاه وجود دارد. بامیه در تندرستی و تنظیم ترشح غده های داخلی بدن، بسیار سودمند است. این گیاه با داشتن لعاب ویژه و الیاف سلولزی در جدار میوه موجب پاک کردن دستگاه گوارش و آسان تر شدن هضم غذا در بدن می شود.

میوه تازه بامیه با سایر سبزی ها به خصوص بانجمان، کدو و گوجه فرنگی پخته و با برنج مصرف می شود. بامیه در تهیه

گیاه بامیه

مقدمه:

گیاه بامیه از خانواده پنیرک است. گیاهان این خانواده با شرایط نامناسب محیطی مانند گرما، خشکی و شوری، سازگار هستند. بامیه به صورت خام و پخته مصرف می شود و با توجه به فایده های زیادی که دارد در غذاهای ایرانی از آن زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. در تقاطعی از ایران که کاشت گوجه فرنگی در سطح وسیعی صورت می گیرد، برای جلوگیری از ضعف شدن خاک و مبارزه با آفت ها و بیماری ها، کاشت بامیه در تناوب زراعی ، می تواند بسیار موثر باشد. با توجه به اهمیت این گیاه از نظر غذایی و اقتصادی، برای راهنمایی کشاورزان در کاشت، داشت و برداشت درست این محصول، تلاش زیادی نشده است.

تاریخچه

بامیه از خانواده پنیریان است. دانشمندان، اصل این گیاه را مربوط به کشور اتیوپی و صحرای اریتره می دانند. این گیاه در جهان گشایی های اسلامی به مصر و دیگر مآال عربی رفته و سپس از آنجا به برزیل برده شده است.

تاریخ نویسان، کشت بامیه را در قرن دوازدهم، در

مژده

اهالی محترم مجتمع های مهرگان ۱ و ۲ و ۳ - بهاران- تایداوتر-

جهاد - سپاه و محلهای مجاور



بندرعباس: بلوار امام حسین (ع) - جنب تالار مهرگان
تلفن: ۳۵۵۴۴۵۷ - ۳۵۵۴۴۵۶ - فاکس: ۳۵۵۲۰۵۰

طالب جذاب و خوشف

جدیدترین اخبار استان ایران جهان

درباره یل ارتباطی شما با دنیای اطلاعات

پایگاه اطلاع رسانی دریانیوز

www.daryanews.ir